WIKIPÉDIA

Hippopotamus lemerlei

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A **Hippopotamus lemerlei** az emlősök *(Mammalia)* osztályának, ezen belül a párosujjú patások *(Artiodactyla)* rendjébe és a vízilófélék *(Hippopotamidae)* családjába tartozó kihalt faj.

Hippopotamus lemerlei

A *Hippopotamus lemerlei* koponyája

Természetvédelmi státusz

Kihalt

EX EW CR EN VU NT LC

Rendszertani besorolás

Ország:	Állatok *(Animalia)*
Törzs:	Gerinchúrosok *(Chordata)*
Altörzs:	Gerincesek *(Vertebrata)*
Főosztály:	Négylábúak *(Tetrapoda)*
Osztály:	Emlősök *(Mammalia)*
Alosztály:	Elevenszülő emlősök *(Theria)*
Csoport:	Eutheria
Alosztályág:	Méhlepényesek *(Placentalia)*
Öregrend:	Laurasiatheria
Csoport:	Cetartiodactyla
Rend:	Párosujjú patások *(Artiodactyla)*
Alrend:	Cetancodonta
Család:	Vízilófélék *(Hippopotamidae)* Gray, 1821
Nem:	Hippopotamus

Tartalomjegyzék

Előfordulása



Az állat csontváza szemből

A Hippopotamus lemerlei maradványait Madagaszkár nyugati részén levő folyókban és tavakban fedezték fel, ami arra hagy következtetni, hogy amint a kontinentális rokona, a nílusi víziló *(Hippopotamus amphibius)* a *H. lemerlei* is kétéltűéletmódot folytatott, azaz idejének nagy részét a vízben töltötte.[1]

A szénizotópos kormeghatározás segítségével a kutatók megállapították, hogy egyes maradványok körülbelül 1000 évesek; azaz ezer évvel ezelőtt ez a vízilófaj még élt.[2])

Megjelenése

A vízi életmódhoz való alkalmazkodás miatt, amint a ma is élő állatnak, ennek a kihalt vízilónak is a szemei a pofa felső peremén helyezkedtek el. A koponyájának az alakja hasonlít a nílusi vízilóéra, azonban a különböző példányok között eltérések vannak, ami a nemi kétalakúságra utal.

Habár a nílusi vízilóval áll közelebbi rokonságban a *H. lemerlei* testmérete inkább a Nyugat-Afrikában élő törpe víziló *(Choeropsis liberiensis)* méretével egyezik meg. A *H. lemerlei* testhossza 2 méter és a marmagassága 70 centiméter volt. Ennek az állatnak az ősei meglehet, hogy rendes, nagy méreteket öltöttek, azonban a szigetre érkezés után, az izolált zsugorodásnak következtében, a következő nemzedékek egyre kisebb méretűek lettek; ez történt a Földközi-tenger szigetein élő krétai törpevízilóval *(Hippopotamus creutzburgi)* és a ciprusi törpe vízilóval *(Hippopotamus minor)* is.[3][4]

	Linnaeus, 1758
Faj:	***H. lemerlei***

Tudományos név

Hippopotamus lemerlei

Milne Edwards, 1868

Szinonimák

-

Hivatkozások

 A Wikifajok tartalmaz ***Hippopotamus lemerlei*** témájú rendszertani információt.

 A Wikimédia Commons tartalmaz ***Hippopotamus lemerlei*** témájú kategóriát.

Jegyzetek

1. Tyson, Peter. *The Eighth Continent; Life, Death and Discovery in the Lost World of Madagascar*. New York: William Morrow (2000). ISBN 0-380-97577-7
2. [[[:Sablon:IUCNlink]] *Hippopotamus lemerlei*]. *IUCN Red List*, 2002. (Hozzáférés: 2007. július 4.)
3. Boisserie, Jean-Renaud (2005). „The phylogeny and taxonomy of Hippopotamidae (Mammalia: Artiodactyla): a review based on morphology and cladistic analysis (https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2004.00138.x)”. *Zoological Journal of the Linnean Society* **143**, 1–26. o. DOI:10.1111/j.1096-3642.2004.00138.x (https://dx.doi.org/10.1111/j.1096-3642.2004.00138.x). (Hozzáférés ideje: 2007. június 1.)
4. Harris, J.M. (1991). „Family Hippopotamidae”. *Koobi Fora Research Project. Vol. 3. the Fossil Ungulates: Geology, Fossil Artiodactyls and Paleoenvironments*, 31–85. o, Kiadó: Clarendon Press, Oxford.

Fordítás

Ez a szócikk részben vagy egészben a *Malagasy hippopotamus* című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának (https://en.wikipedia.org/wiki/Malagasy_hippopotamus?oldid=634939872) fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.
